



Mevet



www.veterindistribution.ro

GESLIN 0,0040 mg/ml

Soluție injectabilă pentru porcine, bovine, cabaline și iepuri

Buserelin (acetat)



Mevet

Polígono Industrial El
Segre Parc. 409-410
25191 Lleida (Spain) T.
+34 973 210 269
www.mevet.es

Marketed by:

MPA Veterinary medicines and additives S.L.
Av. Corts Catalanes, 5-7
08173 Sant Cugat del Vallès (Spain)
T. +34 93 747 96 59
www.mpaveterinary.com

Importator: **Veterin Distribution SRL**

Șoseaua Olteniței, nr. 247
077160 Popești-Leordeni, Ilfov
Telefon: 0371.190.455
www.veterindistribution.ro
office@veterindistribution.ro

GESLIN 0,0040 mg/ml

Soluție injectabilă pentru porcine, bovine, cabaline și iepuri

Buserelin (acetat)

COMPOZIȚIE PER ml

Substanța activă:

Buserelin (acetat) 0,0040 mg

Excipienți:

Benzil alcool (E 1519) 20 mg



SPECII ȚINTĂ

Scroafe pentru reproducție, vaci, iepe și iepuroaice.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Scroafe pentru reproducție: inducerea ovulației.

Vaci: Tratamentul chiștilor foliculari. Anestru aciclic (nu datorat prezenței corpului luteal). Îmbunătățirea fertilității la femelele cu istoric de ovulație întârziată. Atrazie foliculară. Îmbunătățirea ratei de gestație în cazul inseminării artificiale sau montei naturale.

Iepe: Tratamentul chiștilor foliculari. Anovulație asociată cu estru prelungit în ciuda existenței unui folicul bine dezvoltat. Inducerea ovulației.

Iepuroaice: Inducerea ovulației după fătare. Îmbunătățirea ratei de gestație în cazul inseminării artificiale sau montei naturale.

PERIOADA DE AȘTEPTARE

Scroafe pentru reproducție, vaci, iepe și iepuroaice: carne și organe: zero zile.

Vaci și iepe: lapte: zero zile.

DOZA ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Administrare intramusculară, de preferat. Pot fi folosite și căile intravenoasă și subcutanată.

Scroafe pentru reproducție: Inducerea ovulației: 0.010 mg buserelin/animal (2.5 ml produs/animal) în doză unică.

Vaci: Tratamentul chiștilor foliculari: 0.020 mg buserelin/animal (5 ml produs/animal) în doză unică.

Anestru aciclic: 0.020 mg buserelin/animal (5 ml produs/animal) în doză unică.

Îmbunătățirea fertilității la femelele cu istoric de ovulație întârziată: 0.010 mg buserelin/animal (2.5 ml produs/animal) în doză unică.

Atrazie foliculară: 0.010 mg buserelin/animal (2.5 ml produs/animal) în doză unică.

Îmbunătățirea ratei de gestație în cazul inseminării artificiale sau montei naturale: 0.010 mg buserelin / animal (2.5 ml produs / animal) în doză unică cu 8 ore înainte sau în timpul inseminării artificiale sau montei naturale.

Iepe: Tratamentul chiștilor foliculari: 0.040mg buserelin/ animal (10 ml produs/animal) în doză unică.

Anovulație asociată cu estru prelungit și folicul bine dezvoltat: 0.040 mg buserelin / animal (10 ml produs / animal) în doză unică.

Îmbunătățirea fertilității: 0.040 mg buserelin/animal (10 ml produs/animal) în doză unică cu 6 ore înainte sau chiar înainte de montă.

Iepuroaice: Inducerea ovulației după fătare: 0.0008 mg buserelin/animal (0.2 ml produs/animal) în doză unică la 24 de ore după fătare. Inseminarea se va efectua imediat. Pentru îmbunătățirea ratei de gestație se va administra în timpul inseminării sau montei.



CONDIȚII DE DEPOZITARE

A se păstra la frigider (2 °C – 8 °C).

Păstrați flaconul în ambalajul de carton pentru a-l feri de lumina.

AMBALARE

Cutie cu 1 flacon x 20 ml.

Cutie cu 5 flacoane x 20 ml