

Ketoprocen

Ketoprocen 100 mg/ml

Soluție injectabilă pentru bovine,
ecvine și suine



- Durere
- Febră
- Inflamație



IMPORTATOR: VETERIN DISTRIBUTION SRL

www.veterindistribution.ro tel: 0371.190.455

email: office@veterindistribution.ro

cenavisa

Ketoprocen

Soluție injectabilă

COMPOZIȚIE:

Substanța activă: Ketoprofen 100 mg/ml

Excipient: Alcool benzilic.....10 mg/ml

SPECII ȚINTĂ: Ecvine,
bovine și suine

INDICAȚII:

Ecvine:

Tratamentul stărilor inflamatorii ale sistemului osteoarticular și musculoscheletic asociate cu durere acută și inflamație: șchiopătură de origine traumatică, artrită, artroză, leziuni articulare (entorse, sinovite), fracturi, tendinite, peritendinite, laminite, miozite, afecțiuni ale copitelor (boala naviculară). Ketoprofenul este indicat și pentru inflamațiile post-chirurgicale, tratamentul simptomatic al colicilor și al febrei.

Bovine:

Tratamentul bolilor asociate cu inflamație, durere sau febră: procese inflamatorii asociate bolilor respiratorii, mastite, dureri osteoarticulare și musculoscheletice, cum ar fi schiopătutul, artrite, leziuni, colici.

Suine:

Tratamentul bolilor asociate cu inflamație, durere sau febră: tratamentul sindromului Mastită-Metrită-Agalaxie, infecția tractului respirator, tratamentul simptomatic al febrei. Pentru ameliorarea pe termen scurt a durerii post-operatorii asociată cu intervenții chirurgicale minore ale țesuturilor moi, cum ar fi castrarea la purcea. Ketoprofenul poate fi combinat cu tratamentul antimicrobian adecvat.

DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Ecvine: 2.2 mg ketoprofen/kg g.c./zi, administrare IV, o dată pe zi timp de 3-5 zile consecutive, echivalentul a 1 ml per 45 kg g.c. Pentru tratamentul colicilor, o singură administrare este suficientă. A doua administrare a ketoprofenului necesită o reevaluare a stării de sănătate a animalului.

Bovine: 3 mg ketoprofen/ kg g.c./zi administrare IV sau IM profund o dată pe zi, timp de 3 zile consecutive, echivalentul a 3 ml per 100 kg g.c.

Suine: 3 mg ketoprofen/kg g.c. în doză unică, administrare IM , echivalentul a 3 ml per 100 kg g.c (0.03 ml/ kg). Pentru reducerea durerii post-operatorii, produsul trebuie administrat cu 10-30 minute înainte de intervenția chirurgicală. Se va utiliza un dispozitiv de dozare adecvat (seringă cu dozaj redus) și se va determina greutatea corporală exactă a animalului.

TIMP DE AȘTEPTARE:

Cabaline: Carne: 4 zile, Lapte: zero ore

Bovine: Carne: 4 zile, Lapte: zero ore

Suine: Carne: 4 zile.

DIMENSIUNEA AAMBALAJULUI:

Flacoane x 100 ml, x 250 ml.

Datele din aceasta broșura sunt informative. Pentru mai multe informații, vă rugăm consultați prospectul produsului.



- Durere
- Febră
- Inflamație