

Cenflox 100

Marbocen 100

12 zile
timp de asteptare la carne
o singura doza

4 zile
timp de asteptare la carne

**PENTRU CA
TIMPUL ESTE
IMPORTANT**



Enrofloxacină 100 mg/ml



Marbofloxacină 100 mg/ml

Cenflox 100

COMPOZITIE:

Fiecare ml contine:

Substanta activa:

Enrofloxacină.....100 mg

Excipienti:

n-Butanol

Arginina

Alcool bencilic

Alti excipienti, c.s.

SPECII TINTA:

Bovine și porcine.

INDICATII:

Bovine:

Tratamentul infecțiilor aparatului respirator cauzate de *Histophilus somni*, *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* și *Mycoplasma* spp. sensibile la enrofloxacină, precum și la tratamentul mastitelor cauzate de *E.Coli*.

Porcine:

Tratamentul bronhopneumoniei bacteriene cauzată de *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Haemophilus parasuis* și *Pasteurella multocida* sensibile la enrofloxacină.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Bovine:

Doza pentru boli respiratorii este de 7,5 mg enrofloxacină / kg p.v. pentru un singur tratament subcutanat (SC). Aceasta este echivalentă cu 7,5 ml de medicament veterinar la 100 kg p.v.

Nu administrați mai mult de 15 ml (bovine) sau 7,5 ml (viței) în același loc de injecție (subcutanat).

Doza pentru tratamentul colimastitei este de 5 mg enrofloxacină la kg p.v. intravenos (IV). Aceasta este echivalentă cu 5 ml de medicament veterinar la 100 kg p.v. o zi

Tratamentul pentru colimastită este exclusiv intravenos timp de 2 până la 3 zile consecutive.

Porcine:

Doza pentru boli respiratorii este de 7,5 mg enrofloxacină la kg p.v. intramuscular (IM) pentru un singur tratament. Aceasta este egală cu 0,75 ml de medicament veterinar la 10 kg p.v.

Nu administrați mai mult de 7,5 ml pe același loc de injecție (intramuscular).

În cazul bolilor respiratorii severe sau cronice, o a doua injecție poate fi necesară 48 de ore mai târziu..

TIMP DE AȘTEPTARE:

Bovine:

Carne: (SC): 14 zile, (IV): 7 zile.

Lapte: (SC): 120 ore (5 zile), (IV): 72 ore (3 zile).

Porcine:

Carne: (IM): 12 zile.

PREZENTARE:

Flacon x 100ml, x 250ml

NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE: 190111

Marbocen 100

COMPOZITIE:

Fiecare ml contine:

Substanta activa:

Marbofloxacină100 mg

Excipienti:

Metacrezol

Tioglicerol

Edetat de sodiu

Alti excipienti, c.s.

SPECII TINTA:

Bovine și porcine (scroafe și porci la îngrășat)

INDICATII:

Bovine:

Tratamentul infecțiilor respiratorii cauzate de tulpinile de *Histophilus somni*, *Mannheimia haemolytica*, *Mycoplasma bovis* și *Pasteurella multocida* sensibile la marbofloxacină.

Tratamentul mastitei acute cauzate de tulpini de *E. coli* sensibile la marbofloxacină în perioada alăptării.

Porcine:

Tratamentul sindromului de disgalaxie postpartum (SDP) - sindrom Metrită Mastită Agalaxia - cauzată de tulpinile bacteriene sensibile la marbofloxacină.

Tratamentul la porcii de îngrășare a infecțiilor respiratorii cauzate de tulpinile sensibile de *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Mycoplasma hyopneumoniae* și *Pasteurella multocida* sensibile la marbofloxacină.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Bovine:

Infecții respiratorii: 2 ml de medicamente / 25 kg greutate vie într-o singură injecție intramusculară. Dacă volumul de injectat este mai mare de 20 ml, doza trebuie împărțită în două sau mai multe puncte de injecție. În infecțiile cu *Mycoplasma bovis*: 1 ml de medicament / 50 kg greutate vie, într-o singură injecție zilnică, timp de 3 până la 5 zile consecutive, intramuscular sau subcutanat. Prima injecție poate fi administrată intravenos.

Mastită acută: 1 ml de medicament / 50 kg greutate vie într-o singură injecție zilnică, timp de 3 zile consecutive, intramuscular sau subcutanat. Prima injecție poate fi administrată intravenos.

Porcine:

Scroafe adulte: SDP - MMA: 1 ml de medicament / 50 kg greutate vie într-o singură injecție zilnică timp de 3 zile consecutive intramuscular.

Porci la îngrășat: infecții respiratorii: 1 ml de medicament / 50 kg greutate vie într-o injecție zilnică timp de 3 până la 5 zile intramuscular. Injectarea la bovine și porci se va face de preferință în zona gâtului.

TIMP DE AȘTEPTARE:

Bovine:

8 mg / kg într-o singură injecție (IM): Carne: 3 zile. Lapte: 72 ore.

2 mg / kg timp de 3 sau 5 zile (IV / SC / IM): Carne: 6 zile. Lapte: 36 ore.

Porcine:

Carne: 4 zile

PREZENTARE:

Flacon x 50ml, x 100ml, x 250ml

NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE: 190052

