

LATROXIN 100 mg/ml

Soluție injectabilă pentru bovine, porcine și ovine
Tulatromicină



COMPOZIȚIA PER ml

Substanță activă:

Tulatromicină 100,0 mg

Excipienți:

Monotioglicerol 5,0 mg

SPECII ȚINTĂ

Bovine, porcine și ovine.

INDICAȚII PENTRU UTILIZARE

Bovine: Tratamentul și metafilaxia bobilor respiratorii la bovine (BRB) asociate cu *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Histophilus somni* și *Mycoplasma bovis* susceptibile la tulatromicină. Prezența bolii la nivelul grupului trebuie stabilită înainte de utilizarea produsului medicinal veterinar. Tratamentul cheratoconjunctivitei infecțioase bovine (CIB) asociată cu *Moraxella bovis* susceptibilă la tulatromicină.

Porcine: Tratamentul și metafilaxia bobilor respiratorii la porcine (BRS) asociate cu *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Haemophilus parasuis* și *Bordetella bronchiseptica* susceptibile la tulatromicină. Prezența bolii la nivelul grupului trebuie stabilită înainte de utilizarea produsului medicinal veterinar. Produsul medicinal veterinar trebuie să fie utilizat doar dacă se așteaptă ca porcii să prezinte semne de boală în următoarele 2-3 zile.

Ovine: Tratamentul stadiilor incipiente ale pododermatitei infecțioase (șchiopul oilor) asociată cu *Dichelobacter nodosus* virulent, care necesită tratament sistemic.

TIMPI DE AȘTEPTARE

Bovine: Carne și organe: 22 zile.

Porcine: Carne și organe: 13 zile.

Ovine: Carne și organe: 16 zile.

Nu este autorizată utilizarea la animale care produc lapte pentru consum uman, Nu se utilizează la animale în perioada de gestație care sunt destinate producției de lapte pentru consum uman, în interval de 2 luni până la fătare.

CANTITĂȚI DE ADMINISTRAT ȘI CALEA DE ADMINISTRARE

Bovine: O singură injecție subcutanată cu 2,5 mg tulatromicină/kg greutate corporală (echivalent cu 1 ml/40 kg greutate corporală). Pentru tratamentul bovinelor cu greutate mai mare de 300 kg greutate corporală se va diviza doza astfel încât să nu se administreze mai mult de 7,5 ml într-un singur punct.

Porcine: O singură injecție intramusculară cu 2,5 mg tulatromicină/kg greutate corporală (echivalent cu 1 ml/40 kg greutate corporală) în regiunea gâtului. Pentru tratamentul porcilor cu greutate mai mare de 80 kg greutate corporală se va diviza doza astfel încât să nu se administreze mai mult de 2 ml într-un singur punct.

Ovine: O singură injecție intramusculară cu 2,5 mg tulatromicină/kg greutate corporală (echivalent cu 1 ml/40 kg greutate corporală) în regiunea gâtului.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

AMBALARE

Sticlă:

Cutie de carton cu 1 flacon de 100 ml

Cutie de carton cu 1 flacon de 250 ml

NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

210058



Mevet

Pol. Ind. El Segre P-410

25191 Lleida, Spania

Tel. -34 973 210 269