



Flunixin meglumin 5%

Fluvex



SOLUȚIE INJECTABILĂ

ANTIINFLAMATOR NESTEROIDIAN

Răspuns Imediat!



Antiinflamator
Analgezic
Antipiretic

Eficacitate în mai puțin
de 15 minute!



Flacoane sterile PP
transparente de 100 și 250 ml

Indicate pentru soluții parenterale, ușor, sigur
și ușor de manevrat




s.p.[®] veterinaria

CONTROLEAZĂ INFLAMAȚIA ÎMBUNĂȚĂȘTE BUNĂSTAREA ANIMALELOR

Concentrația plasmatică/în țesuturile inflamate

(Injectie intramusculară la scroafe)




Concentrațiile mari în țesuturile inflamate permit o mai bună difuzie a antimicrobienelor în zona de elecție

Cea mai bună alegere
terapeutică pentru
patologia inflamatorie
la speciile porcine,
bovine și ecvine

Diferite proprietăți antiinflamatorii

FLUVEX



Fluvex

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Flunixin (sub forma de flunixin meglumin)...50.0 mg/ml
(Echivalent cu 82,9 mg flunixin meglumin)

INDICAȚII DE UTILIZARE

Bovine: Controlul inflamației, pirexiei și / sau durerii asociate bolilor respiratorii bovine, tulburărilor gastro-intestinale și mastitei.

Cai: Controlul inflamației, pirexiei și / sau durerii asociate cu afecțiuni musculo-scheletice sau asociate cu colici.

Porci: Recomandat ca terapie adjuvantă în tratamentul sindromului metrită-mastită-agalaxie (MMA) la scroafe.

DOZA ȘI CALEA DE ADMINISTRARE

Bovine și cai: Intravenos

Porci: Intramuscular

Bovine: 2,2 mg flunixin / kg greutate corporală (echivalent cu 2 ml / 45 kg greutate corporală). Administrarea poate fi repetată, la un interval de 24 de ore, timp de 3 zile consecutive, în funcție de recuperarea clinică.

Cai: 1,1 mg flunixin / kg greutate corporală (echivalent cu 1 ml / 45 kg greutate corporală) o dată pe zi. Tratamentul poate fi administrat pe cale intravenoasă până la 5 zile în funcție de răspunsul clinic.

Porci: 2,2 mg de flunixin / kg greutate corporală (echivalent cu 2 ml / 45 kg greutate corporală) prin injecție IM profundă (5 cm). Flunixin nu trebuie injectat în țesutul adipos.

CITIȚI PROSPECTUL PENTRU MAI MULTE DETALII

TIMP DE AȘTEPTARE

Bovine: Carne: 4 zile / Lapte: 1 zi (24 de ore)

Cai: Carne: 4 zile

A nu se utiliza la iepele care produc lapte pentru consum uman

Porci: Carne: 28 de zile

AMBALAJ

Cutie cu 1 flacon de 100 ml

Cutie cu 1 flacon de 250 ml

FLUVEX is Licensed in BE, BG, EL (Flunixin meglumine), ES, IT, PL, PT, RO.
For UK and IE: DUGNIXON / Global Vet Health.

Informațiile conținute în această broșură sunt destinate să completeze sfaturile medicului veterinar.
Pentru informații complete, contactați distribuitorul nostru local VETERIN DISTRIBUTION



s.p. veterinaria, s.a.

Ctra. Reus-Vinyols, km 4.1 - P.O. Box. 60 - Tel. +34 977 850 170* - Fax +34 977 850 405 - 43330 RIUDOMS (Tarragona) - SPAIN

www.spveterinaria.com