

Piresol®

SOLUȚIE PENTRU UTILIZARE ÎN APA DE BĂUT PENTRU PORCI **300 mg/ml**

✓
Asorbție rapidă. Concentrații plasmatice eficiente se obțin la 10 minute după ingestie, atingând niveluri maxime după 90 de minute.

✓
Biodisponibilitate de 81%, nu se leagă de proteinele plasmatice.

✓
Rată rapidă de eliminare, nu se acumulează în țesuturi.

STABILITATE

Menține o concentrație stabilă în apa de băut, de peste **95%** din concentrația inițială timp de 24 de ore. Calitatea apei nu influențează stabilitatea timp de **24** de ore.

Nu provoacă ulcere

	% ULCERE	SEVERITATE
Paracetamol (30 mg/kg g.c.)	0	-
Acid acetilsalicilic (50 mg/kg g.c.)	20	Leziuni superficiale

Nu afectează procesul de coagulare a sângelui

Marjă mare de siguranță

(de 5 ori doza și de două ori timpul de administrare).

PARACETAMOL este un derivat de para-aminofenol cu proprietăți analgezice și antipiretice. Proprietățile antipiretice pot fi explicate prin capacitatea de a inhiba ciclo-oxigenazele din creier. **Paracetamolul** este un slab inhibitor al sintezei de COX-1, nu are efecte secundare gastro-intestinale și nu are efect asupra agregării plachetare.

Compoziție:

Paracetamol..... 300 mg

Excipienți 1 ml

Specii țintă și indicații:

Suine: Tratament simptomatic la febrei

Căi de administrare și dozare:


Orală, în apa de băut.

Suine: 30 mg paracetamol/kg g.c./zi, timp de 5 zile. Echivalent aproximativ pentru 1 L **PIRESOL 300 mg/ml** în 1000 L apă de băut.

Perioadă de așteptare: 0 zile

Prezentare: 1 și 5 L.

EFICACITATE



I t a t V e t e i s t i t i

Olteniței 247, Popești-Leordeni, IF
0371.190.455
www.veterindistribution.ro
office@veterindistribution.ro



s.p.® veterinaria, s.a.

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4.1 • 43330 RIUDOMS (Tarragona) SPAIN(
Tel. +34 977 850 170* • Fax +34 977 850 405 • P.O. BOX 60(
www.spveteraria.com