




corticen 2 mg/ml

Soluție injectabilă
Dexametazonă

- *Eficiență maximă*
- *Seringabilitate excelentă*
- *Spectru larg de utilizare*



- **Procese inflamatorii și alergice**
- **Inducerea parturii la bovine**
- **Cetoză primară (acetonemie) la bovine**
- **Artrite, bursite sau tenosinovite la cai**



corticen 2 mg/ml

Soluție injectabilă Dexametazonă

COMPOZIȚIE PER ML:

Substanță activă: dexametazonă ca dexametazonă fosfat de sodiu..... 2.0 mg
Excipienți: Alcool benzilic (E 1519)..... 15.6 mg

SPECII ȚINTĂ

Cabaline, bovine, porcine, câini și pisici.

INDICAȚII DE UTILIZARE:

Cai, bovine, porci, câini și pisici: Tratamentul proceselor inflamatorii sau alergice.

Bovine: Inducerea travaliului și tratamentul cetozei primare.

Cai: Tratamentul artritei, bursitei sau sinovitei.

DOZĂ PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Căi de administrare: Cai: IV, IM sau intraarticular. Bovine, porci, câini și pisici: utilizare IM.

Cai, bovine, porcine: 1,5 ml / 50 kg.

Câini, pisici: 0,5 ml / 10 kg.

Pentru tratamentul cetozei primare la bovine (acetonemie): se recomandă 5-10 ml/500 kg g.c., în funcție de durata semnelor. Trebuie avut grijă să nu se supradozeze la rasele Jersey, Guernsey și/sau rase înrudite. Doze mai mari vor fi necesare dacă semnele au fost prezente pentru o perioadă prelungită de timp sau dacă se tratează animale care au recidivat. În majoritatea cazurilor cu simptome recente, se va obține o vindecare cu o singură doză.

Pentru inducerea travaliului: 10 ml/500 kg bw ca doză unică după ziua 260 de gestație. Fătarea va avea loc de obicei în 48 până la 72 de ore.

Pentru tratamentul artritei, bursitelor sau tenosinovitei, prin injectare intraarticulară, la cai: Doza 1 ml - 5 ml.

Aceste cantități nu sunt specifice și sunt menționate doar pentru referință. Injecțiile în spațiile intraarticulare sau burse trebuie precedate de îndepărtarea unui volum echivalent de lichid sinovial.

PERIOADA DE AȘTEPTARE:

Bovine: Carne și organe: 8 zile. Lapte: 72 ore

Porci: Carne și organe: 2 zile.

Cai: Carne și organe: 8 zile. Nu este autorizat pentru utilizare la caii care produc lapte pentru consum uman.

PREZENTARE:

Flacoane de 100 ml. Cutii care conțin 10 flacoane de 100 ml.

UZ VETERINAR

Veterin Distribution SRL

Șoseaua Olteniței, nr. 247
077160 Popești-Leordeni, Ilfov
Tel. 0371.190.455
www.veterindistribution.ro
office@veterindistribution.ro

