



Injectable
Orale
Premixuri medicamentoase
Suplimente nutriționale

TOLFENIL 40 mg/ml

Soluție injectabilă

Acid tolfenamic



COMPOZIȚIA PER ml

Substanță activă:

Acid tolfenamic 40,0 mg

Excipienți:

Alcool benzilic (E 1519) 10,4 mg

Sulfoxilat de formaldehidă de sodiu 5,0 mg

SPECII ȚINTĂ

Bovine, porcine, câini și pisici.

INDICAȚII PENTRU UTILIZARE

Bovine: ca adjuvant în reducerea inflamației acute asociate bolilor respiratorii. Ca adjuvant în tratamentul mastitei acute.

Porcine: ca adjuvant în tratamentul sindromului de mastită-metrită-agalaxie.

Câini: pentru tratamentul sindroamelor inflamatorii și a durerilor postoperatorii. Pentru reducerea durerilor postoperatorii.

Pisici: ca adjuvant în tratamentul bolilor respiratorii superioare în asociere cu terapia antimicrobiană, dacă este cazul.

TIMPI DE AȘTEPTARE

Bovine: Carne și organe: Cale intramusculară: 12 zile. Cale intravenoasă: 4 zile.

Lapte: Cale intramusculară: zero ore. Cale intravenoasă: 24 ore.

Porcine: Carne și organe: 16 zile.

CANTITĂȚI DE ADMINISTRAT ȘI CALEA DE ADMINISTRARE

Bovine: Ca adjuvant în reducerea inflamației acute asociate bolilor respiratorii: 2 injecții cu 2 mg acid tolfenamic/kg greutate corporală (echivalent cu 1 ml produs/20 kg greutate corporală), pe cale IM în mușchii gâtului, la interval de 48 ore. Nu depășiți 20 ml la un loc de injectare. Ca adjuvant în tratamentul mastitei acute: 4 mg acid tolfenamic/kg greutate corporală (echivalent cu 1 ml produs/10 kg greutate corporală) pe cale IV, într-o singură doză.

Porcine: Ca adjuvant în tratamentul sindromului de mastită-metrită-agalaxie: 2 mg acid tolfenamic/20 kg greutate corporală (echivalent cu 1 ml produs/20 kg greutate corporală), pe cale IM în mușchii gâtului, într-o singură doză. Nu depășiți 20 ml la un loc de injectare.

Câini: Pentru tratamentul sindroamelor postoperatorii inflamatorii și dureroase: 4 mg acid tolfenamic/kg greutate corporală (echivalent cu 1 ml produs/10 kg greutate corporală) pe cale IM sau SC. Această doză poate fi repetată după 24 de ore. Pentru reducerea durerilor postoperatorii: 4 mg acid tolfenamic/kg greutate corporală (echivalent cu 1 ml produs/10 kg greutate corporală), pe cale IM, într-o singură doză, cu o oră înainte de anestezie.

Pisici: Ca adjuvant în tratamentul bolilor respiratorii superioare în asociere cu terapia antimicrobiană, dacă este cazul: 4 mg acid tolfenamic/kg greutate corporală (echivalent cu 1 ml produs/10 kg greutate corporală), pe cale SC. Această doză poate fi repetată după 24 de ore. Nu administrați pe cale IM la pisici.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

AMBALARE

Sticlă:

Cutie de carton cu 1 flacon de 20 ml

Cutie de carton cu 1 flacon de 100 ml

Cutie de carton cu 1 flacon de 250 ml

NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

1347F01



Mevet

Pol. Ind. El Segre P-410

25191 Lleida, Spania

T. +34 973 210 269

Vall Compañy
G R U P O