

Albecorin 100 mg/ml

Albendazol 100mg/ml

Suspensie antiparazitara pentru bovine

Palatabilitate crescută


Ușor de administrat

Actiune rapidă și eficientă

Suspensie micronizata

Preț atractiv

2 tipuri de prezentare



IMPORTATOR: VETERIN DISTRIBUTION SRL.

tel. 0371.190.455

office@veterindistribution.ro

www.veterindistribution.ro

bc
cenavisa
LABORATORIOS

Nou



Albecorin 100 mg/ml

Albendazol 100mg/ml

Suspensie antiparazitara pentru bovine



Compozitie pentru 1 ml:

Albendazol 100mg/ml

Specii tinta:

Bovine

Indicatii de utilizare:

Tratamentul nematodozelor gastrointestinale si pulmonare produse de catre nematode sensibile la albendazol, in stadii larvare si adulte :

-Nematode gastrointestinale : Ostertagia ostertagi, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis

Cooperia ancophora, Oesophagostomum radiatum, Haemonchus contortus, Nematodirus helvetianus.

-Nematode pulmonare : Dictyocaulus viviparus

Tratamentul cestodozelor produse de Moniezia expansa

Tratamentul fasciolozei acute cauzate de forme adulte ale Fasciola hepatica.

Doze si mod de administrare:

Se administreaza pe cale orala.

-Tratamentul nematodozelor gastrointestinale, pulmonare si cestodozelor : 7,5 mg albendazol/ kg greutate corporala (echivalent cu 0.75 ml produs / 10 kg greutate corporala) in doza unica.

-Tratamentul fasciolozei : 10 mg albendazol / kg greutate corporala (echivalent a 1 ml produs/ 10 kg greutate corporala) in doza unica.

Se va agita produsul inainte de utilizare. Administrarea se efectueaza cu ajutorul unui pistol dozator.

Pentru a garanta administrarea dozei corecte, se va determina greutatea corporala cat mai precis si va trebui sa fie verificata precizia dozatorului.

In cazul in care animalele vor fi tratate in grupuri vor trebui sa fie grupate dupa greutatea corporala iar dozarea se va efectua in functie de greutate, pentru a evita atat subdozarea cat si supradozarea. Calendarul sau momentul tratamentului trebuie sa se bazeze pe factori epidemiologici si sa fie personalizat pentru fiecare exploatare. Programul de tratament trebuie sa fie stabilit de medicul veterinar.

Timp de asteptare:

Bovine

Carne și organe : 14 zile

Lapte: 4 zile

Prezentare:

Flacoane de 1 L, 5 L.

Numarul autorizatiei de comercializare: 150010
Se elibereaza numai pe baza de reteta veterinara.

*** Datele din aceasta brosură sunt informative.
Pentru mai multe detalii, va rugăm consultați
prospectul produsului.**