DOXIPULVIS 500 mg/g

Doxiciclină 50 % WSP



1/10

diluție în apa de băut

Potrivit pentru toate tipurile de sisteme de adăpare

Importator:
VETERIN DISTRIBUTION SRL
Sos. Olteniței, 247
077160 Popesti-Leordeni, IF
Telefon: 0371.190.455
www.veterindistribution.ro
office@veterindistribuiton.ro

s.p.® veterinaria

Solubilitate excelentă (până la 1 Kg DOXIPULVIS 500 mg/g în 10 litri apă de băut)

SOLUȚIE PREPARATĂ 0 ORE

SOLUȚIE PREPARATĂ 30 ORE



Produs	Apă cu duritate scăzută (CaCO3: 20 mg/L, pH 5,6)		Apă foarte dură (CaCO3: 350 mg/L, pH 8,5)	
	5ºC	20ºC	5ºC	20ºC
Produs de referința	2m	1m 30s	2m 15s	1m 40s
DOXIPULVIS 500 mg/g	**1m 30s**	**54s**	**1m 36s**	**1m**

Stabilitate crescută Stabilitatea DOXIPULVIS 500 mg/g în apa de băut (% activitate)



Apă cu duritate scăzută (20 mg/L CaCO3, pH 5,6)



Apă foarte dură (350 mg/L CaCO3, pH 8,5)

DOXIPULVIS 500 mg/g pulbere pentru apa de baut / înlocuitor de lapte
Doxiciclină (hiclat) .....500 mg per gram
(Echivalent cu 577,1 mg doxiciclină hiclat)

SPECII ȚINTĂ și INDICAȚII:
Bovine (viței pre-rumegători), porci, găini (broileri, reproducători) și curci (broileri, reproducători). Viței: Tratamentul și metafilaxia infecțiilor respiratorii și digestive cauzate de germeni susceptibili la doxiciclină.
Porci, găini și curci: Tratamentul și metafilaxia infecțiilor respiratorii cauzate de germeni susceptibili la doxiciclină.
Prezența bolii în efectivul de animale trebuie stabilită înainte de aplicarea tratamentului metafilactic.

DOZE, CĂI ȘI METODE DE ADMINISTRARE
A se administra pe cale orală în apa de băut, înlocutior de lapte sau furaj lichid.
10 mg doxiciclină / kg g.c. / zi (echuivalent cu 11.54 mg doxiciclină hyclat/kg g.c. /zi), timp de 3-5 days, echuivalent cu 0.02 g pulbere solubilă / kg dizolvată în apa de băut, înlocuitor de lapte sau furaj lichid.
Pentru o dozare corectă, se va determina cât mai precis greutatea corporală a animalului, precum și consumul zilnic de apă și furaj. Doza se calculează conform cu formula existentă în prospect.

PRIOADA DE AȘTEPTARE:
Carne și organe:
Viței: 14 zile, Porci: 6 zile, Găini: 7 zile, Curci: 12 zile

Ouă: Nu se utilizează la păsările care produc ouă pentru consum uman. Nu se utilizează cu 4 săptămâni înainte de începerea ouatului.

DOXIPULVIS 500 mg/g este înregistrat în CY, DE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, PL, PT, RO, UK.

Informațiile din această broșură au fost revizuite de către Personalul Tehnic și sunt destinate completării sfatului medicului veterinar. Pentru Sumarul Caracteristicilor Produsului contactați distribuitorul local sau solicitați consultanță pe website-ul **www.spveterinaria.com**

s.p.® veterinaria, s.a.

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 • P.O. BOX 60 • 43330 RIUDOMS (Tarragona) SPAIN
Tel: +34 977 850 170 • Fax: +34 977 850 405
info@spveterinaria.com · www.spveterinaria.com