

HIDROCOL

4.000.000 UI/ml Colistină



Soluție pentru apa de băut/lapte

**Când colibaciloza pune în
pericol sănătatea animalelor
și calitatea alimentelor**

PERIOADĂ DE AȘTEPTARE

**Viței, miei și purcei
pui de găină și curci
Carne și organe: 1 zi
Ouă: zero zile**



s.p.[®] veterinaria

HIDROCOL

4.000.000 UI/ml Colistină

Soluție pentru apa de băut/lapte

Substanță activă:

Colistină (sulfat)..... 4.000.000 IU/ml



SPECII ȚINTĂ

Bovine (viței), oi (miei), porci, pui de găină și curci.

INDICAȚII, DOZE ȘI CĂI DE ADMINISTRARE

Bovine (viței), ovine (miei), porci, pui de găină și curci:
Tratamentul și metafilaxia infecțiilor enterice cauzate de *E. Coli* neinvazivă, sensibilă la colistină.

ADMINISTRARE ORALĂ ÎN APA DE BĂUT / LAPTE

Viței, miei, porci: 100.000 UI de colistină pe kg greutate corporală zilnic timp de 3-5 zile consecutive în apă de băut sau lapte (înlocuitor) la viței, echivalent cu 0,25 ml de soluție concentrată la 10 kg greutate corporală pe zi timp de 3-5 zile.

Pui de găină și curci: 75.000 UI de colistină pe kg greutate corporală zilnic timp de 3-5 zile consecutive în apă de băut, echivalentul a 18,75 ml de soluție concentrată pe tonă de greutate corporală pe zi timp de 3-5 zile.

Durata tratamentului trebuie limitată la timpul minim necesar pentru tratamentul bolii.

Orice apă medicamentată care nu este consumată în 24 de ore trebuie aruncată.

Orice lapte medicamentat care nu este consumat în decurs de 3 ore trebuie aruncat.

ATENȚIONĂRI PENTRU SPECIILE ȚINTĂ

Colistina exercită activitate dependentă de concentrație împotriva bacteriilor *Gram-negative*. După administrarea orală, se obțin concentrații mari în tractul gastrointestinal, adică la locul țintă, datorită absorbției slabe a substanței. Acești factori indică faptul că nu se recomandă o durată mai lungă de tratament decât cea indicată, ceea ce ar duce la expunere inutilă.

Ca adjuvant al tratamentului, trebuie introduse bune practici de management și igienă pentru a reduce riscul de infecție și pentru a controla potențiala acumulare de rezistență.

PERIOADE DE AȘTEPTARE

Viței, miei, porci:

Carne și organe: 1 zi

Nu este autorizat pentru utilizare la animalele care produc lapte pentru consum uman.

Pui de găină și curci:

Carne și organe: 1 zi

Ouă: zero zile

RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRARE CORECTĂ

Rezervor de apă potabilă: dizolvare directă excelentă.

Dozator de medicamente: o soluție stoc de 5 % este stabilă (0,5 L Hidrocol în 10 L apă de băut)

Potrivit pentru dozator la rata de includere 1 %, 2 % și 5 %.

Deși informațiile conținute în acest prospect au fost revizuite de personalul nostru tehnic, acestea sunt menite să completeze sfaturile medicului veterinar. Pentru SPC complet, contactați distribuitorul nostru local sau cereți sfaturi prin intermediul site-ului nostru www.spveterinaria.com

Ambalaj: 1 L , 5 L.

HIDROCOL este înregistrat în BG, CY, EL, ES, FR, HU, IE, IT, MT, PL, PT, RO, UK.

Importator:

Veterin Distribution SRL

Șoseaua Olteniței, nr. 247

077160 Popești-Leordeni, Ilfov

Telefon: 0371.190.455

www.veterindistribution.ro

office@veterindistribution.ro



s.p.® veterinaria

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 - P.O. Box. 60 - Teléfono +34 977 850 170* - Fax +34 977 850 405 - 43330 RIUDOMS (Tarragona) SPAIN

www.spveterinaria.com