




MARBOCOLI

Marbofloxacina

100 mg/ml

solutie injectabila pentru bovine si suine



Mastite

Tripla alegere



IV

IM

SC

Infectii Respiratorii

O singura administrare



IM

Sindrom MMA

Trei administrari



IM

UN
SINGUR
PRODUS
MAI MULTE
OPȚIUNI

MARBOCOLI 100 mg/ml

Solutie injectabila pentru bovine si suine

COMPOZITIE PER ML

Substanta activa
Marbofloxacina 100,0 mg
Excipienti ad1 ml
Grupa farmacoterapeutica: Antibacteriene pentru uz sistemic, Fluorochinolone.



DESCRIERE

Marbofloxacina este un antimicrobian sintetic bactericid cu activitate dependenta de concentratie, apartinand grupului de fluorochinolone, care actioneaza prin inhibarea ADN-girazei. Are un spectru larg de actiune in vitro impotriva *Histophilus somni*, *Mannheimia Haemolytica*, *Pasteurella Multocida*, *E. coli* si *Mycoplasma bovis*.

Dupa administrarea subcutanata sau intramusculara la bovine si administrarea intramusculara la suine, la doza recomandata de 2 mg/kg g.c., marbofloxacina este absorbita cu usurinta si atinge concentratii plasmatiche maxime de 1,5 µg/ml in mai putin de o ora. Biodisponibilitatea sa este de aproape 100%. Marbofloxacina este slab legata de proteinele plasmatiche (mai putin de 10% la suine si 30% la bovine), distribuite pe scara larga si in cele mai multe tesuturi (ficat, rinichi, piele, plamani, vezica, uter, tract digestiv), atingand o concentratie mai mare decat in plasma.

INDICATII SI SPECII TINTA

Bovine:
•Tratamentul infectiilor respiratorii cauzate de tulpinile de *Histophilus haemolytica*, *Mycoplasma bovis* si *Pasteurella multocida* sensibile la marbofloxacina.
•Tratamentul a *Escherichia coli* sensibile la marbofloxacina in perioada de lactatie.

Suine:
•Tratamentului Sindromului Disgalaxie Postpartum-SDP-(Sindromul Metrita-Mastita-Agalaxie), cauzat de tulpinile de bacterii sensibile la marbofloxacina.

CANTITATI DE ADMINISTRAT SI CALEA DE ADMINISTRARE

Bovine:
Infectii respiratorii:
Doza recomandata este de 8 mg marbofloxacina/kg g.c. (2 ml produs/25 kg g.c.) intr-o singura injectie pe cale intramusculara. Daca volumul care trebuie injectat este mai mare de 20 ml, acesta trebuie impartit intre doua sau mai multe locuri de injectare.

In cazul infectiilor respiratorii cauzate de *Mycoplasma bovis*, doza recomandata este de 2 mg marbofloxacina/kg g.c. (1 ml produs/50 kg g.c.), intr-o singura administrare pe zi, timp de 3 zile consecutive, pe cale intramusculara sau subcutanata. Prima injectie poate fi administrata pe cale intravenoasa.

Mastite acute:

Doza recomandata este de 2 mg marbofloxacina/kg g.c. (1 ml produs/50 kg g.c.) intr-o singura injectie pe zi, timp de 3 zile consecutive pe cale intramusculara sau subcutanata.

Suine (scroafe):

Doza recomandata este de 2 mg marbofloxacina/kg g.c. (1 ml/50 mg g.c.) intr-o singura injectie pe zi, timp de 3 zile consecutive pe cale intramusculara.

RECOMANDARI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTA

Pentru teatrat
La bovine si suine, locul de injectare este de preferinta regiunea gatului.
Capacul poate fi intepat in siguranta pana la 30 ori.

PERIOADA DE ASTEPTARE

Bovine: 8 mg/kg o singura data (IM) Carne si organe: 3 zile. Lapte: 72 ore
2 mg/kg timp de 3 pana la 5 zile (IV/SC/IM) Carne si organe: 6 zile. Lapte: 36 ore

Suine (scroafe): Carne si organe: 4 zile.

Flacoane de 100 ml si 250 ml.

Numarul autorizatiei de comercializare: 150165



Importator: Veterin Distribution SRL

Olteniei 247, Popesti-Leordeni, IF
0371.190.455

www.veterindistribution.ro
office@veterindistribution.ro



Ctra.inyolsarragona)el.eos,