

MYCOFLOR®

Florfenicol 300 mg/ml solutie injectabila

MYCOFLOR®, solutie injectabila cu **seringibilitate exceptionala.**


Administrare usoara, chiar si cu ace foarte fine.

Testare in conditii de teren

Seringibilitatea produsului MYCOFLOR® comparativ cu un Produs de Referinta folosind ace 20 G (0,9 mm ϕ). Timpul (secunde) necesar pentru aspirarea a 5 ml de solutie injectabila.

| | P1 | P2 | P3 |
|---------------------|----|----|----|
| Mycoflor® | 7 | 13 | 10 |
| Produs de referinta | 31 | 31 | 60 |


> 60 de secunde: imposibil de aspirat cei 5 ml de solutie
Testul de seringibilitate



s.p.® veterinaria

MYCOFLOR®

Florfenicol 300 mg/ml solutie injectabila




Indicatii:

In tratamentul infectiilor cauzate de bacterii sensibile la Florfenicol.

Bovine: Tratamentul infectiilor cailor respiratorii determinate de tulpini de Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida si Histophilus somni.

Suine: Tratamentul focarelor de boli respiratorii acute determinate de tulpini de Actinobacillus pleuropneumonie si Pasteurella multocida.

Excelenti parametri de biodisponibilitate si farmacocinetica



| Date de susceptibilitate | CMI ₅₀ |
|----------------------------|-------------------|
| <i>P. multocida</i> | 0,25-0,50 |
| <i>A. pleuropneumoniae</i> | 0,25-0,39 |
| <i>S. suis</i> | 1 |

Priebe, 2003.



Florfenicol este un antibiotic sintetic cu spectru larg, eficient impotriva bacteriilor Gram pozitive si Gram negative.

Florfenicol actioneaza prin inhibarea sintezei proteice la nivel ribozomal avand efect bacteriostatic.

MYCOFLOR®- spectru larg de actiune impotriva bolilor respiratorii.

Doze si mod de administrare:

Pentru a asigura o dozare corecta si pentru a evita supradozarea, greutatea corporala trebuie sa fie determinata cat mai precis posibil.

Bovine: Administrare IM, 20 mg/kg greutate corporala (1 ml/15 kg), de doua ori la un interval de 48 ore.

Suine: Administrare IM, 15 mg/kg greutate corporala (1 ml/20 kg) in muschii gatului, de doua ori la un interval de 48 ore.

Pentru mai multe informatii va rugam consultati prospectul oficial al produsului.

 **s.p.® veterinaria, s.a.**

Ctra. Reus-Vinyols, km 4.1 - P.O. Box. 60
Tel. +34 977 850 170* - Fax +34 977 850 405
43330 RIUDOMS (Tarragona) - SPAIN
www.spveterinaria.com