



Injectabile

Orale

Premixuri medicamentoase

Suplimente nutriționale

GESLIN 0,0040 mg/ml

Soluție injectabilă pentru bovine, cal, porci și iepure



COMPOZIȚIE PER ml

Substanță activă:

Buserelin 0,0040 mg

Excipienți:

Alcool benzilic (E 1519) 20 mg

SPECII ȚINTĂ

Bovine (vaca), cal (iapa), porc (scroafa pentru reproducție) și iepure (femela pentru reproducție).

INDICAȚII DE UTILIZARE

Bovine (vaca): Tratamentul chisturilor foliculare. Anestru datorat lipsei ciclului sexual (nu din cauza prezenței corpului galben). Îmbunătățirea ratei de concepție la femelele cu istoric de ovulație întârziată. Atrezia foliculară. Îmbunătățirea ratei de concepție în inseminarea artificială sau împerechere.

Cal (iapa): Tratamentul chisturilor foliculare. Lipsa ovulației asociată cu un estru prelungit în ciuda prezenței unui folicul matur. Inducerea ovulației.

Porc (scroafa pentru reproducție): Pentru inducerea ovulației.

Iepure (femela pentru reproducție): Inducerea ovulației post-partum. Îmbunătățirea ratei de concepție în cadrul procedurilor de inseminare artificială sau împerechere.

PERIOADE DE AȘTEPTARE

Carne și organe (vaca, iapa, scroafa pentru reproducție și femela de iepure pentru reproducție): zero zile. Lapte (vaca și iapa): zero zile.

DOZE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ȘI METODE DE ADMINISTRARE

Utilizare intramusculară, subcutanată sau intravenoasă.

Bovine (vaca): Tratamentul chisturilor foliculare: 0,020 mg buserelin/animal (echivalent cu 5 ml produs medicinal veterinar/animal) într-o singură doză. Dacă nu s-a detectat un corp galben la 10-14 zile după aplicare, tratamentul trebuie repetat. Anestru datorat lipsei ciclului sexual (nu din cauza prezenței corpului galben): 0,020 mg buserelin/animal (echivalent cu 5 ml produs medicinal veterinar/animal) într-o singură doză. Estrul va apărea între 8 și 22 de zile mai târziu. Cu toate acestea, dacă estrul nu a apărut după 10-12 zile, trebuie efectuată o palpăre de control. Alternativ se poate determina prezența progesteronului în lapte. Tratamentul trebuie repetat în acest prim moment dacă ovarele nu au început să funcționeze. Cu toate acestea, în cazul în care se palpează un corp galben, atunci trebuie administrată prostaglandină luteolitică pentru a induce estrul sau apariția naturală a estrului, care va apărea după 10-12 zile. Îmbunătățirea fertilității la vacile cu ovulație întârziată: 0,010 mg de buserelin/animal (echivalent cu 2,5 ml produs medicinal veterinar/animal) într-o singură doză. Atrezia foliculară: 0,010 mg buserelin/animal (echivalent cu 2,5 ml produs medicinal veterinar/animal) într-o singură doză. Îmbunătățirea ratei de concepție în cadrul procedurilor de inseminare artificială sau împerechere: 0,010 mg buserelin/animal (echivalent cu 2,5 ml produs medicinal veterinar/animal) într-o doză unică, cu 8 ore înainte sau chiar înaintea inseminării sau a împerecherii. Alternativ, aceeași doză de 0,010 mg buserelin/animal (echivalent cu 2,5 ml produs medicinal veterinar/animal) poate fi administrată la 11-12 zile după inseminare pentru a preveni luteoliza și moartea embrionului în consecință. **Cal (iapa):** Tratamentul chisturilor foliculare: 0,040 mg de buserelin/animal (echivalent cu 10 ml de produs medicinal veterinar/animal) într-o singură doză. Dacă nu s-a detectat un corp galben la 10-14 zile după aplicare, tratamentul trebuie repetat. Lipsa ovulației cu estru prelungit și folicul bine dezvoltat: 0,040 mg buserelin/animal (echivalent cu 10 ml produs medicinal veterinar/animal) într-o doză unică. Îmbunătățirea ratei de concepție: 0,040 mg buserelin/animal (echivalent cu 10 ml produs medicinal veterinar/animal) într-o doză unică, cu 6 ore înainte sau chiar înaintea împerecherii. **Porc (scroafa pentru reproducție):** Inducerea ovulației: 0,010 mg buserelin/animal (echivalent cu 2,5 ml produs medicinal veterinar/animal) într-o singură doză. **Iepure (femela pentru reproducție):** Inducerea ovulației post-partum: 0,0008 mg buserelin/animal (echivalent cu 0,2 ml produs medicinal veterinar/animal) într-o singură doză la 24 de ore post-partum. Inseminarea trebuie efectuată imediat după administrare. Pentru a crește rata de concepție, buserelinul trebuie aplicat în timpul procedurilor de inseminare artificială sau de împerechere.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la temperatură mai mică de 25 °C. A se păstra flaconul în cutia de carton pentru a se feri de lumină.

DIMENSIUNILE AMBALAJELOR

Cutie din carton cu 1 flacon de 20 ml. Cutie din carton cu 5 flacoane de 20 ml.

NUMERELE AUTORIZAȚIILOR DE COMERCIALIZARE

240009



Mevet
Pol. Ind. El Segre P-410
25191 Lleida, Spain
T. +34 973 210 269

Vall Companys
G R U P O



Veterin Distribution SRL
Șoseaua Olteniței, nr. 247
077160 Popești-Leordeni, Ilfov
Tel. 0371.190.455
www.veterindistribution.ro
office@veterindistribution.ro