



Injectabile

Orale

Premixuri medicamentoase

Suplimente nutriționale

SINCROVALL 75 µg/ml

Soluție injectabilă pentru bovine, porci și cai



COMPOZIȚIE PER ml

Substanță activă:

D-Cloprostenol (sub formă de D-cloprostenol sodic) 75 µg

Excipienți:

Clorocresol 1,0 mg

SPECII ȚINTĂ

Bovine (vacii), porci (scroafe), cai (iepe).

INDICAȚII DE UTILIZARE

Bovine (vacii): Sincronizarea sau inducerea estrului. Inducerea parturii. Disfuncție ovariană (*corp luteal* persistent, *chist luteal*). Endometrită/piometrită. Involuție uterină întârziată. Inducerea avortului în prima jumătate a perioadei de gestație. Expulzarea fătului mumificat.

Porci (scroafe): Inducerea parturii.

Cai (iepe): Inducerea luteolizei la iepe cu un *corp luteal* funcțional.

PERIOADE DE AȘTEPTARE

Bovine: Carne și organe: zero zile. Lapte: zero ore.

Porci: Carne și organe: 1 zi.

Cai: Carne și organe: 2 zile. Lapte: zero ore.

DOZE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ȘI METODE DE ADMINISTRARE

Nu mai pentru utilizare intramusculară.

Bovine (vacii): Administrați 2 ml de produs medicinal veterinar/animal, echivalent cu 150 µg de d- cloprostenol/animal: Sincronizarea estrului: administrați produsul medicinal veterinar de două ori, la un interval de 11 zile între cele două doze. Prin urmare, continuați cu două inseminări artificiale la intervale de 72 și 96 de ore de la a doua injecție. Inducerea estrului (și la vacii cu manifestări reduse sau silențioase de călduri): administrați produsul medicinal veterinar după ce s-a stabilit prezența unui corp luteal (a 6-a - a 18-a zi a ciclului); căldurile apar de obicei în decurs de 48-60 de ore. Prin urmare, continuați cu inseminarea în decurs de 72 -96 de ore după injectare. Dacă estrul nu este evident, administrarea produsului medicinal veterinar trebuie repetată la 11 zile după prima injecție. Inducerea parturii după 270 de zile de gestație: administrați produsul medicinal veterinar după 270 de zile de gestație. De obicei, fătarea are loc în decurs de 30 -60 de ore de la tratament. Disfuncție ovariană (*corp luteal* persistent, *chist luteal*): când s-a determinat prezența corpului luteal, administrați produsul medicinal veterinar, apoi continuați cu inseminarea la primul estru după injectare. Dacă ciclul estral nu este evident, efectuați un examen ginecologic și repetați injecția la 11 zile după prima administrare. Inseminarea trebuie efectuată întotdeauna între 72-96 de ore după injectare. Endometrită/piometrită: administrați 1 doză de produs medicinal veterinar. Dacă este necesar, repetați tratamentul după 10 zile. Involuție uterină întârziată: administrați produsul medicinal veterinar și, dacă este considerat necesar, efectuați unul sau două tratamente succesive la intervale de 24 de ore. Inducerea avortului în prima jumătate a perioadei de gestație (până la 150 de zile de gestație): administrați produsul medicinal veterinar în prima jumătate a perioadei de gestație. Expulzarea fătului mumificat: administrați 1 doză de produs medicinal veterinar. Expulzarea fătului a fost observată în decurs de 3-4 zile de la administrarea produsului. **Porci (scroafe):** Administrați 1 ml de produs medicinal veterinar/animal echivalent cu 75 µg de d-cloprostenol/animal, pe cale intramusculară, nu mai devreme de 114 zile de gestație. Repetați după 6 ore Alternativ, la 20 de ore după doza inițială, se poate administra un stimulant miometric (oxitocină sau carazolol). După protocolul dublei administrări, aproximativ 70-80% dintre animale vor naște într-un interval între 20 și 30 de ore după prima administrare. **Cai (iepe):** Inducerea luteolizei la iepe cu un *corp luteal* funcțional: administrați 1 ml de produs medicinal veterinar/animal, echivalent cu 75 µg de d-cloprostenol/animal.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra flaconul în cutia de carton pentru a se feri de lumină.

DIMENSIUNILE AMBALAJELOR

Cutie din carton cu 1 flacon de 20 ml. Cutie din carton cu 5 flacoane de 20 ml.

NUMERELE AUTORIZAȚIILOR DE COMERCIALIZARE

230177



Mevet
Pol. Ind. El Segre P-410
25191 Lleida, Spain
T. +34 973 210 269



Veterin Distribution SRL
Șoseaua Olteniței, nr. 247
077160 Popești-Leordeni, Ilfov
Tel. 0371.190.455
www.veterindistribution.ro
office@veterindistribution.ro