


Cefavex

CEFTIOFUR 50mg/ml



Suspensie injectabilă pentru porcine și bovine



s.p.[®] veterinaria

Cefavex 50 mg/ml

Suspensie injectabilă pentru porcine și bovine

COMPOZIȚIE

Un ml de suspensie conține:

Ceftiofur (sub formă de clorhidrat) 50,0 mg

SPECII ȚINTĂ ȘI INDICAȚII DE UTILIZARE

Porci:

Pentru tratamentul bolilor respiratorii bacteriene asociate cu *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* și *Streptococcus suis*.

Bovine:

Pentru tratamentul bolilor respiratorii bacteriene asociate cu *Mannheimia haemolytica* (anterior *Pasteurella haemolytica*), *Pasteurella multocida* și *Histophilus somni* (anterior *Haemophilus somnus*).

Pentru tratamentul necrobacilozei interdigitale acute (panaritium, putregaiul piciorului), asociată cu *Fusobacterium necrophorum* și *Bacteroides melaninogenicus* (*Porphyromonas asaccharolytica*).

Pentru tratamentul componentei bacteriene a metritei acute postpartum (puerperale) în primele 10 zile după fătare, asociată cu *Escherichia coli*, *Arcanobacterium pyogenes* și *Fusobacterium necrophorum*, sensibile la ceftiofur. Indicația este limitată la cazurile în care tratamentul cu un alt antimicrobian a eșuat.

CALE DE ADMINISTRARE ȘI DOZĂ

Citiți prospectul înainte de utilizare.

Porci:

3 mg ceftiofur/kg greutate corporală/zi timp de 3 zile pe cale intramusculară, adică 1 ml/16 kg greutate corporală la fiecare injecție.

Bovine:

Boli respiratorii: 1 mg ceftiofur/kg greutate corporală/zi timp de 3 până la 5 zile prin injecție subcutanată, adică 1 ml/50 kg greutate corporală la fiecare injecție. Necrobaciloză interdigitală acută: 1 mg/kg greutate corporală/zi timp de 3 zile prin injecție subcutanată, adică 1 ml/50 kg greutate corporală la fiecare injecție. Metrită acută postpartum în decurs de 10 zile de la fătare: 1 mg/kg greutate corporală/zi timp de 5 zile consecutive prin injecție subcutanată, adică 1 ml/50 kg greutate corporală la fiecare injecție.

Pentru informații detaliate despre Farmacodinamică și Farmacocinetică, contactați-ne prin e-mail sau pe site-ul nostru web.

TIMP DE AȘTEPTARE

Porci:

Carne și organe: 5 zile.

Bovine:

Carne și organe: 8 zile.

Lapte: zero ore

PREZENTARE: Flacoane a câte 100 ml.

Notificare: Informațiile despre produs sunt furnizate doar în scop informativ. Vă rugăm să citiți prospectul produsului pentru o utilizare corectă. Rețineți că textul de pe etichetă poate fi supus reglementărilor locale din țara de destinație.



s.p.[®] veterinaria, s.a.

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 • P.O. BOX 60

43330 RIUDOMS (Tarragona) SPAIN

Tel: +34 977 850 170

internacional@spveterinaria.com

www.spveterinaria.com



Veterin Distribution SRL

Șoseaua Olteniței, nr. 247

077160 Popești-Leordeni, Ilfov

www.veterindistribution.ro

office@veterindistribution.ro