




dipacxon plus

Cipermetrină 10% + Tetrametrină 6%




dipacxon plus

Cipermetrină 10% + Tetrametrină 6%

COMPOZIȚIE PE ML:

Cipermetrină 100 mg
Tetrametrină..... 60 mg
Excipienți q.s.



INDICAȚII:

Insecticid-acaricid pentru utilizare în mediul zootehnic.



Gândaci, purici, muște, țânțari, furnici, ploșnițe, căpușe, păduchi, viespi, acarieni.

DOZARE ȘI MOD DE UTILIZARE:

Se aplică prin pulverizare sau aspersie, diluat în apă, conform dozei specificate.

Pentru insecte zburătoare: 2,5 mL în 1 L de apă (0,25%).

Dezinsecție obișnuită: 5 mL în 1 L de apă (0,5%).

Infestări puternice: 10 mL în 1 L de apă (1%).

Reaplicări: 2,5 mL în 1 L de apă (0,25%).

Curățați înainte de tratament. Atât curățarea prealabilă, cât și tratamentul trebuie efectuate în absența animalelor, a hranei pentru animale și a apei. Nu aplicați tratamentul pe suprafețe care vor fi în contact cu hrana sau apa animalelor.

Utilizați amestecul în ziua pregătirii.

Aplicați tratamentul în absența animalelor.

PERIOADA DE SIGURANȚĂ:

Trebuie respectată o perioadă de siguranță de 24 de ore pentru pulverizare și de 48 de ore pentru nebulizare.



APLICARE	DOZARE	MOD DE UTILIZARE	INDICAȚII	RECOMANDĂRI
Aplicați produsul pe toate suprafețele de tratat și pe zonele adiacente.	2.5 - 10 ml / litru de apă. Suprafața de tratat cu fiecare litru de soluție este de 20m ²	Aplicați soluția preparată prin pulverizare pe toate suprafețele de tratat.	Stadii adulte	În funcție de infestări. Ori de câte ori se observă prezența dăunătorilor. Ca regulă generală, la fiecare 3-6 săptămâni.