


Noan desinfectante

DDAC 100 mg/ml + Glutaraldehidă 150 mg/ml



virusuri



bacterii



funghi



- Bactericid
- Fungicid
- Virucid
- Sporid

**Efficient împotriva Pestei Porcine
Africane și Influenței Aviare**

Nou! Extindere aviz
Efect virucid la **4° C** timp de **5 minute**



Noan desinfectante

DDAC 100 mg/ml + Glutaraldehydă 150 mg/ml



EFICIENT ÎMPOTRIVA
GRIPEI AVIARĂ

COMPOZIȚIE PER ml:

- Glutaraldehydă 150 mg
- Clorura de didecildimetilamoniu 100 mg
- Aromatizant mentolat, coloranți și excipienți q.s.

CARACTERISTICI:

Un amestec sinergic de sare de amoniu cuaternar de ultimă generație (clorură de didecildimetilamoniu) cu un dezinfectant aparținând grupului de aldehide (glutaraldehydă), puternic bactericid, virucid și levuricid. Activitatea clorurii de didecildimetilamoniu este redusă puternic în prezența materiei organice și, prin urmare, este necesară o curățare prealabilă adecvată înainte de utilizarea acesteia.

MECANISM DE ACȚIUNE:

Clorura de didecildimetilamoniu este un dezinfectant cationic foarte activ asupra membranelor și metabolismului celular al microorganismelor. Se leagă ireversibil la fosfolipidele și proteinele membranei celulare, afectând astfel impermeabilitatea. Glutaraldehyda acționează direct asupra grupărilor SH și NH ale componentelor nucleofile ale celulei prin modificarea metabolismului acesteia. Glutaraldehyda acționează asupra peretelui celular, la nivelul punților traversate de peptidoglican.

SPECTRU DE ACȚIUNE:

NOAN DESINFECTANTE este un bactericid puternic (*Vibrio anguillarum*, *Tenacibaculum maritimum*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Salmonellatyphimurium*, *Salmonella enteritidis*, *Salmonella panama*, *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus faecalis*, *Streptococcus faecalis*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Mycobacterium avium*, *Mycobacterium phlei*, *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma tuberculosis*, *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella bronchiseptica*, *Corynebacterium diphtheriae intermedius*, *Bacillus cereus*, *Clostridium perfringens*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Pseudomonas fluorescens*, *Proteus mirabilis*,...), fungicid / levuricid (*Aspergillus niger*, *Aspergillus fumigatus*, *Aspergillus flavus*, *Candida albicans*, *Microsporum canis*, *Penicillium glaucum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Microsporum gypseum*, ...), virucida (sindromul caderii ouatului, PRRSv, Gumboro, PCV, anemie infecțioasă aviară, bronșită infecțioasă aviară, pesta porcină africană, pesta porcină clasică, laringotraheită aviară, boala Marek, Aujeszky, rinotraheită bovină, pesta aviară, gripa aviară, boala de Newcastle, febra aftoasă, boala veziculoasă a porcului, enterovirusul bovin, mixomatoză, rabia, Maedi-Visna, Leucoză,...) și sporicid (*Clostridium sporogenes*, *Bacillus cereus*,...).

INDICAȚII:

Dezinfectant bactericid, levuricid și virucid pentru uz zootehnic. Curățarea și dezinfectarea suprafețelor, a pardoselilor, a pereților, a plafoanelor, a echipamentelor, a băilor de picioare și culoarelor în mediul zootehnic.

DOZA ȘI MODUL DE UTILIZARE:

Se poate aplica prin stropire/pulverizare, nebulizare sau imersie în **doza de aplicare între 0,1-1,5%**

Stropire sau pulverizare, manuală sau mecanică: 1 litru soluție / 10 m²

Termonebulizare: 1 litru produs + 3 litri apă / 1.000 m³


Imersie (baie de picioare): 50 ml produs / 1 litru apă (se reînnoiește soluția la fiecare 48 de ore)

Indicații: pesta porcină africană, gripa aviară, febra aftoasă, parvovirus porcin 0,5%

pesta porcină africană 0,5% la 4 °C timp de 30 minute

efect virucid 0,5% la 4 °C timp de 5 minute

PREZENTARE:



5 L

25 L

6162BIO/03/09.2026

Veterin Distribution SRL

Șoseaua Olteniței, nr. 247
077160 Popești-Leordeni, Ilfov
Tel. 0371.190.455
www.veterindistribution.ro
office@veterindistribution.ro

