



LINCOVEX 100 mg/ml
Soluție injectabilă



Perioadă minimă de așteptare

Porci sănătoși fără întârziere



s.p.[®] veterinaria
spveterinaria.com





LINCOVEX 100 mg/ml

Lincomycin | Antibacterial | Soluție injectabilă



Perioadă minimă de așteptare

COMPOSITION (1 ml)

Lincomycin (sub formă de clorhidrat de lincomicină monohidrat)

100.0 mg

SPECII ȚINTĂ

Porci / Câini / Pisici



AMBALAJ

100 ml / 250 ml



INDICAȚII PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ

Porci:

Pentru tratamentul infecțiilor cauzate de bacterii Gram-pozitive, anumite bacterii anaerobe și Mycoplasma spp.

Câini și pisici:

Pentru tratamentul infecțiilor cauzate de bacterii Gram-pozitive, în special streptococi și anumite bacterii anaerobe.



CĂI DE ADMINISTRARE ȘI DOZAJ

Porci (administrare intramusculară):

Doza recomandată este de 11 mg lincomicină/kg greutate corporală o dată pe zi (echivalentul a 1 ml produs/9 kg greutate corporală), timp de 3 zile consecutive.

Câini și pisici (administrare intramusculară sau intravenoasă lentă):

Doza recomandată este de 22 mg lincomicină/kg greutate corporală (echivalentul a 1 ml produs/4,5 kg greutate corporală), administrată o dată pe zi, sau 11 mg lincomicină/kg greutate corporală (echivalentul a 1 ml produs/9 kg greutate corporală), administrată la fiecare 12 ore.



PERIOADA DE AȘTEPTARE

Porci:

Came și organe: 3 zile

