



LINCOVEX 100 mg/ml
Soluție injectabilă



Perioadă minimă de așteptare

Porci sănătoși fără întârziere



s.p.[®] veterinaria
spveterinaria.com





LINCOVEX 100 mg/ml

Lincomycin | Antibacterial | Soluție injectabilă



Perioadă minimă de așteptare

COMPOSITION (1 ml)

Lincomycin (sub formă de clorhidrat de lincomicină monohidrat)

100.0 mg

SPECII ȚINTĂ

Porci / Câini / Pisici



AMBALAJ

100 ml / 250 ml



INDICAȚII PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ

Porci:

Pentru tratamentul infecțiilor cauzate de bacterii Gram-pozitive, anumite bacterii anaerobe și Mycoplasma spp.

Câini și pisici:

Pentru tratamentul infecțiilor cauzate de bacterii Gram-pozitive, în special streptococi și anumite bacterii anaerobe.



CĂI DE ADMINISTRARE ȘI DOZAJ

Porci (administrare intramusculară):

Doza recomandată este de 11 mg lincomicină/kg greutate corporală o dată pe zi (echivalentul a 1 ml produs/9 kg greutate corporală), timp de 3 zile consecutive.

Câini și pisici (administrare intramusculară sau intravenoasă lentă):


Doza recomandată este de 22 mg lincomicină/kg greutate corporală (echivalentul a 1 ml produs/4,5 kg greutate corporală), administrată o dată pe zi, sau 11 mg lincomicină/kg greutate corporală (echivalentul a 1 ml produs/9 kg greutate corporală), administrată la fiecare 12 ore.



PERIOADA DE AȘTEPTARE

Porci:

Came și organe: 3 zile



The information contained in this leaflet has been reviewed by our Technical Staff and its intended to complement the advice of the veterinary professional. For full SPC, contact with our local distributor or ask for advice through our website www.spveterinaria.com