

Encefalomielita aviară este o boală virală care afectează puii cu vârsta mai mică de 2 săptămâni și păsările ouătoare. Păsările reproducătoare nevaccinate, care se infectează în timpul producției de ouă, transmit virusul descendenților timp de cel puțin 5 săptămâni. La puii tineri, boala se caracterizează prin paralizie flască și mortalitate, aceasta depășind în general 10%. Păsările ouătoare infectate în timpul perioadei de ouat prezintă o scădere a producției de ouă, care poate ajunge la 40%

Vaccin viu liofilizat împotriva encefalomielitei aviare

ENCEFAL-VAC

TULPINA CALNEK 1143

POTENȚIAL IMUNOGEN RIDICAT

PROTECȚIE TRANSMISĂ DE LA GĂINI LA PUI

PROTECȚIE ÎN PERIOADA DE OUAT





ENCEFAL-VAC

PROPRIETĂȚI

ENCEFAL-VAC este preparat utilizând tulpina Calnek 1143 de encefalomielită aviară. Tulpina Calnek 1143, ușor atenuată, dar cu un enterotropism ridicat, este utilizată în mod obișnuit împotriva encefalomielitei, datorită potențialului său imunogen ridicat.

COMPOZIȚIE

1 doză de vaccin conține:
nu mai puțin de 10^3 EID₅₀

ADMINISTRARE

În apa de băut.
Păsări care vor deveni ouătoare și păsări de reproducție:
Vârsta cea mai potrivită pentru vaccinare este între luna a 3-a și a 4-a; puii trebuie să fie într-o stare bună de sănătate.
Se recomandă să se lase un interval de 14 zile între această vaccinare și alte vaccinări.

PĂSTRARE

ENCEFAL-VAC trebuie păstrat la frigider, la o temperatură cuprinsă între +2°C și +8°C.

AMBALARE


Flacoane de 1000 de doze.



Tulpina Calnek 1143, aleasă pentru imunogenitatea sa ridicată, este o tulpină stabilă, cu patogenitate limitată, care a fost utilizată de mai mult timp pentru prepararea vaccinurilor împotriva encefalomielitei aviare. Studiile de teren au demonstrat că o singură vaccinare cu **ENCEFAL-VAC** este capabilă să producă un nivel adecvat de protecție, atât la păsările vaccinate, cât și la descendenții acestora. Imunitatea se instalează complet la 10–15 zile după vaccinare.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA SCĂDERII PRODUCȚIEI DE OUĂ


Procentul producției de ouă la un grup de găini ouătoare comerciale vaccinate cu **ENCEFAL-VAC** și la un grup martor, ambele expuse anterior la o tulpină patogenă de AEV.



■ Păsări vaccinate
■ Păsări nevaccinate

PROTECȚIE DESCENDENȚILOR

ENCEFAL-VAC este capabil să inducă un grad ridicat de protecție la descendenți pe întreaga perioadă productivă a păsărilor de reproducție.



Vârsta descendenților la momentul expunerii experimentale: 1 zi



FATRO | Güneşli
Gürpınar mah. Hilal sok. no: 2/5, Beylikdüzü - İSTANBUL
Tel. +90 212 880 60 40 - Fax +90 212 662 37 28
www.gunesliasi.com.tr - info@gunesliasi.com.tr