

ENCEFAL-VAC

Vaccin viu liofilizat pentru pui

Indicația principiului activ și a celorlalte ingrediente

Vaccinul este preparat cu principiul activ tulpina Calnek 1143 a virusului encefalomielitei aviare.

Titrul vaccinului: minim 10^3 DIE₅₀/doză.

Tulpina Calnek 1143, ușor atenuată, dar cu enterotropism mare, este utilizată de mulți ani, la scară largă pentru a ține sub control Encefalomielita, datorită capacității sale mari de imunizare.

Indicații

ENCEFAL-VAC este indicat pentru profilaxia imunitară orală (prin intermediul apei de băut) a encefalomielitei aviare a puilor.

Previne mortalitatea, simptomele clinice și leziunile provocate de boală.

Protecția începe la 3-4 săptămâni de la vaccinare și durează toată viața productivă a găinilor.

Contraindicații

Niciuna cunoscută.

A se vedea și atenționările speciale.

Evenimente adverse

Niciunul cunoscut. Dacă se manifestă evenimente adverse grave sau alte evenimente care nu au fost precizate în acest prospect, vă rugăm să informați veterinarul.

Specia de destinație

Pui (de ouă și reproducători)

Posologie pentru fiecare specie, calea și modul de administrare

ENCEFAL-VAC este eficace dacă este administrat pe cale orală, prin intermediul apei de băut.

Pentru a obține suspensia de vaccin, este necesar să adăugați în conținutul flaconului o cantitate mică de apă și să dizolvați cu grijă.

În acest moment, se toarnă suspensia în apa de băut considerată necesară pentru vaccinare, clătind flaconul, pentru a evita ca resturi din pulberea de vaccin să rămână nefolosite.

După ce tot conținutul flaconului s-a dizolvat în apa de băut, aveți grijă să amestecați din nou chiar înainte de administrarea efectivă la animale, care trebuie să aibă loc cât mai repede posibil.

Cantitatea de apă necesară pentru vaccinare diferă în funcție de vârsta animalelor, de anotimp, de temperatura mediului. Mai jos, sunt prezentate cantitățile de apă minime și maxime recomandabile în raport cu prima din variabilele de mai sus:

Vârsta pui (săpt.)	Cantitate de apă (litri)
	1000 doze
8-12	20-60
peste 12	50-80

Programul de vaccinare

ENCEFAL-VAC este utilizat pentru vaccinarea viitoarelor găini ouătoare și a reproducătoarelor, pentru a evita eventuala mortalitate din cauza Encefalomielitei la pui și scăderea ouării.

Vârsta cea mai potrivită pentru vaccinare este între a treia și a patra lună.

Se recomandă să mențineți un interval de timp de cel puțin 14 zile față de alte vaccinări. Nu trebuie vaccinați puii cu vârsta mai mică de 2 luni sau aflați în perioada de ouat, drept pentru care, intervenția de vaccinare trebuie efectuată cu cel puțin o lună înainte de intrarea în perioada de ouat.

Precauții pentru o administrare corectă

După reconstituire, vaccinul trebuie utilizat în cel mult una-două ore..

Perioadele de așteptare

Zero zile

Precauții speciale pentru depozitare

ENCEFAL-VAC încă nereconstituit trebuie păstrat în frigider, la o temperatură cuprinsă între +2°C și +8°C.

Atenționări speciale

Nu utilizați în perioada de ouare și cu 4 săptămâni înainte de aceasta.

Nu vaccinați puii cu vârsta mai mică de 2 luni.

Pentru a garanta reușita vaccinării, este necesar să respectați următoarele reguli:

- asigurați-vă că adăpătoarele și apa de băut nu conțin substanțe antiseptice sau dezinfectanți care, chiar și sub formă de urme, pot face inactiv virusul pentru vaccinare;
- utilizați, acolo unde este posibil, adăpătoare de plastic, sticlă sau emailate;
- însetați animalele, suspendând administrarea apei de băut, cu cel puțin trei ore înainte de vaccinare;
- distribuiți suspensia de vaccin obținută din reconstituirea preparatului, într-un număr de adăpătoare care să le permită tuturor animalelor administrarea vaccinului într-un interval de două—trei ore de la prepararea lui;
- nu expuneți apa care conține vaccinul la surse de căldură.

Administrați doar animalelor în stare bună de sănătate.

Precauții speciale pentru utilizarea la animale

Este necesar să adoptați măsurile veterinare și fitosanitare adecvate, pentru a evita răspândirea la speciile sensibile

Precauții speciale care trebuie adoptate de persoana care administrează produsul animalelor

Operatorul trebuie să se spele cu grijă pe mâini, evitând ca vaccinul să intre în contact cu ochii. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la produs trebuie să evite contactul.

Utilizarea în timpul gestației, alăptării sau ouării

Nu utilizați la animalele aflate în perioada de ouare și cu 4 săptămâni înainte de aceasta

Interacțiunea cu alte produse medicinale veterinare și alte forme de interacțiune

Nu sunt disponibile informații despre compatibilitatea acestui vaccin cu altele

Supradozaj (simptome, proceduri de urgență, antidoturi) dacă este necesar

Administrarea unei doze chiar și de 10 ori mai mare nu provoacă reacții deosebite

Incompatibilități

Cu ocazia administrării, trebuie evitată utilizarea apei care conține substanțe dezinfectante, care ar putea neutraliza virusul din vaccin. Nu amestecați acest produs cu alte vaccinuri.

Precauții deosebite pentru eliminarea produsului medicinal veterinar neutilizat sau a eventualelor deșeuri

Eliminați deșeurile prin fierbere, incinerare sau introducerea într-un dezinfectant corespunzător, aprobat pentru utilizare de către autoritățile competente. Materialul rezidual trebuie predat în sisteme corespunzătoare de colectare și eliminare pentru medicamentele neutilizate sau expirate.

DATA ULTIMEI REVIZUIRI A PROSPECTULUI:

APRILIE 2008

NU LĂSAȚI LA ÎNDEMÂNA COPIILOR

SE COMERCIALIZEAZĂ DOAR ÎN BAZA PREZENTĂRII REȚETEI MEDICULUI
VETERINAR ÎN TREI EXEMPLARE, VALABILĂ PENTRU O SINGURĂ CUMPĂRARE

DOAR PENTRU UZ VETERINAR

Titularul autorizației de comercializare și producătorul responsabil de eliberarea lotului:

FATRO S.p.A. – Ozzano Emilia (BO) – 40064 / 22 IAN 2008

Via Emilia 258

Unitatea de producție:

Macloadio (BS)

Via Molini Emili 2