


RODIBROD SENSITIVE PASTA FLUO



- **Activ de la primele ingerări**
- **Utilizare în interior și în exterior**
- **Foarte palatabil**
- **Tehnologie Fluo pentru stimularea vederii rozătoarelor**



Distribuit de:
Veterin Distribution SRL Șoseaua Olteniței, nr. 247
077160 Popești-Leordeni, Ilfov Tel. 0371.190.455
www.veterindistribution.ro - office@veterindistribution.ro



Conținut:
10 Kg

Imagine cu titlu informativ

RODIBROD SENSITIVE PASTA FLUO
Momeala rodenticidă gata pregătită, sub formă de pastă (TP14), pentru utilizare împotriva șoarecilor de casă și șobolanilor bruni la interior și exterior, în jurul clădirilor.

EXCLUSIV PENTRU PROFESIONIȘTI

CARACTERISTICI: RODIBROD SENSITIVE PASTA FLUO este o momeală rodenticidă, gata pregătită, sub formă de pastă, în picături de 10g pentru combaterea șoarecilor de casă și a șobolanilor bruni în toate etapele de dezvoltare, ce conține un component foarte puternic: brodifacoum, o singură doză, substanță activă anticoagulantă de generația a doua. Datorită modului său de acțiune, momeala rozătoarelor se produce fără a trezi suspiciuni altor membri ai coloniei asupra momeli.

Rodenticidul RODIBROD SENSITIVE PASTA FLUO prezintă următoarele caracteristici inovatoare:

-Tehnologia FLUO-NP*: datorită tehnologiei pigment fluorescent, momeala poate fi ușor identificată chiar și în condiții de lumină slabă, dacă este iluminată cu o lampă UV. Când momeala este consumată de rozătoare, formula fluorescentă face fecalele rozătoarelor vizibile sub lumina ultravioletă, acest lucru oferind oportunitatea de a monitoriza activitatea rozătoarelor. Atât monitorizarea consumului de momeală, cât și eventualele deplasări din capace sunt aspecte esențiale în industriile alimentare, depozitele și clădirile zootehnice, unde este important ca momeala să rămână în interiorul capacelor. Tehnologia FLUO-NP* facilitează de asemenea identificarea reziduurilor rămase și colectarea în consecință pentru eliminarea adecvată a acestora.

-PASTA PLUS: o formulă ce combină un amestec bine echilibrat din componente de origine animală, cum ar fi laptele praf, zahărul și grăsimile imbogățite cu cereale, în special gustoase pentru speciile de rozătoare menționate mai sus.

Datorită gustului extrem de atractiv, momeala pastă este extrem de versatilă și utilizarea sa este indicată în zone cu o diversitate mare de hrană, cum ar fi industriile alimentare și depozitele, hotelurile, restaurantele, barurile, etc. De asemenea, poate fi aplicată în centralele de distribuție a electricității și în mijloacele de transport.

RODIBROD SENSITIVE PASTA FLUO conține un agent respingător (Denatonium Benzoate) pentru a preveni consumul de către om.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Categoriile de utilizatori: profesioniști

Metodele de aplicare: Momeala gata de utilizare în stații de intoxicare / capcane (puncte momeală) protejate împotriva deschiderii și a deteriorării.

Rata(ile) de aplicare și frecvența:

-Șoarecele de casă (*Mus musculus*) - la interior și la exterior, în jurul clădirilor:

-Infestare majoră: până la 50 g per stație de intoxicare / capcană (punct momeală) la o distanță de 5 metri

-Infestare redusă: până la 50 g per stație de intoxicare / capcană (punct momeală) la o

distanță de 5 metri
-Șobolanul brun (*Rattus norvegicus*) - la interior și la exterior, în jurul clădirilor:
-Infestare majoră: până la 100 g per stație de intoxicare / capcană (punct momeală) la o distanță de 5 metri
-Infestare redusă: până la 100 g per stație de intoxicare / capcană (punct momeală) la o distanță de 10 metri

Îndepărtări resturile de produs la sfârșitul perioadei de tratament.

Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant. Pentru utilizare la exterior, în jurul clădirilor: Protejeți momeala împotriva condițiilor atmosferice. Amplasați capcanele în zone fără risc de inundare. Înlocuiți momelele deteriorate de apă sau contaminate cu pământ din interiorul capacelor. Pentru utilizare la exterior, capcanele trebuie acoperite și amplasate în locuri strategice pentru a minimiza expunerea speciilor nevizate.

Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant.

ÎNDRUMĂRI PENTRU UTILIZARE: Înainte de utilizare, citiți și respectați informațiile despre produs și toate informațiile care îi însoțesc sau care sunt comunicate în momentul vânzării. Studiați și speciile de rozătoare și locurile de activitate ale acestora și pentru a determina cauzele posibile și amploarea infestării. Îndepărtați hrana la care rozătoarele pot ajunge ușor (de exemplu, boabe de cereale vârsate sau resturi de mâncare). Pe lângă aceasta, nu curățați zona infestată imediat înainte de tratament, deoarece astfel veți deranja populația de rozătoare și veți îngreuna acceptarea momeli. Produsul trebuie să fie utilizat numai în cadrul unui sistem de combatere integrată a dăunătorilor, care include, printre altele, măsuri de asigurare a igienei și, atunci când este posibil, metode fizice de combatere. Produsul trebuie să fie aplicat în imediata apropiere a locurilor în care s-a observat prezența rozătoarelor (de exemplu, câi de acces, locuri de cuibărit, igheburii de hrănire a animalelor, găuri, vizuini etc.). Dacă este posibil, capcanele trebuie să fie fixate pe sol sau de alte structuri. Capcanele trebuie să fie etichetate cu avertismentele clare privind conținutul de rodenticide și interzicerea mutărilor sau a deschiderii acestora. Atunci când produsul este utilizat în zone publice, zonele tratate trebuie să fie marcate pe toată durata tratamentului, iar în apropierea momeli trebuie să se amplaseze avertismentele privind riscul de intoxicare primară sau secundară cu anticoagulant, precum și măsurile de prim-ajutor care se iau în caz de intoxicare. Momeala trebuie să fie fixată pentru a nu putea fi îndepărtată de capcană. Amplasați produsul în locuri inaccesibile pentru copii, păși, animale de companie, animale de fermă și alte animale nevizate. Amplasați produsul la distanță de alimente, băuturi și hrană pentru animale, precum și de ustensile sau suprafețe aflate în contact cu acestea. Manipulați produsul numai cu mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice [EN 374,

categorii III]. Nu consumați alimente sau băuturi și nu fumați în timpul utilizării produsului. După utilizarea produsului, spălați-vă mâinile și pielea direct expusă. Fiecare vârf de produs în zona tratată rămâne la discreția operatorului, în funcție de rezultatele studiului efectuat la începutul perioadei de tratament. Această frecvență trebuie să fie conformă cu recomandările cuprinse în codul de bune practici relevant. Dacă asimilarea momeli este redusă comparativ cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare mutarea capacelor în alte locuri și o eventuală schimbare a formulei momeli. Dacă momeala continuă să fie consumată după o perioadă de tratament de 35 de zile și nu se observă o diminuare a activității rozătoarelor, trebuie să se determine cauza probabilă a acestei situații. Dacă s-au exclus alte cauze, este posibil ca rozătoarele să aibă un grad înalt de rezistență, astfel încât poate fi necesară utilizarea unei rodenticide fără efect coagulant, dacă este disponibil, sau a unui rodenticid anticoagulant puternic. Luați în considerare și utilizarea de curse, ca măsură de combatere alternativă.

Nu deschideți picul cu momeală.

MĂSURI DE REDUCERE A RISCURILOR: Dacă este posibil, înainte de tratament, informați persoanele care s-ar putea afla în preajma capacelor (de exemplu, utilizatorii zonei tratate și ai împrejurimilor acestora) în legătură cu campania de combatere a rozătoarelor. Analizați posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventive (astupați găurile, îndepartați cât mai mult posibil eventualele surse de hrană și băuturi) pentru a crește șansa de consum al produsului și pentru a reduce riscul de reînnoire. Pentru a reduce riscul de intoxicare secundară, căutați și îndepărtați frecvent rozătoarele moarte pe durata tratamentului, conform instrucțiunilor care însoțesc produsul de bune practici relevant. Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru a preveni infestarea cu rozătoare sau pentru a monitoriza activitatea rozătoarelor. Nu utilizați produsul pentru tratamente cu aplicare intermitentă a momeli. A nu se utiliza în zone în care poate fi suspectată o rezistență la substanța activă. Produsele nu se utilizează pe o durată mai mare de 35 de zile fără o evaluare a stării de infestare și a eficacității tratamentului. Nu utilizați prin rotație anticoagulanți diferiți, cu potență comparabilă sau mai mică, în scopul generării rezistenței. Pentru utilizarea prin rotație, analizați posibilitatea folosirii unui rodenticid fără efect coagulant, dacă este disponibil, sau a unui anticoagulant cu potență mai mare. Între aplicări, nu spălați cu apă capcanele sau ustensilele folosite în capcane acoperite și

protejați. Eliminați rozătoarele moarte în conformitate cu cerințele locale.

Pentru utilizare la exterior, în jurul clădirilor:

Nu introduceți produsul direct în vizuini.

INSTRUCȚIUNI DE PRIM AJUTOR ȘI MĂSURI DE URGENȚĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI: Acest produs conține o substanță anticoagulantă. Simptomele în caz de ingestie, care uneori se pot manifesta cu întârziere, pot să includă sângerări nazale și gingivale. În cazuri severe, pot să apară echimoze la suprafața pielii și sânge în excremente sau în urină.

Antidot: vitamina K1, administrată numai de personal medical/veterinar.

În caz de:

- expunere cutanată, spălați pielea cu apă, apoi cu apă și săpun.

- expunere oculară, clătiți ochii cu lichid de uz oral cu apă și țineți pleoapele deschise timp de cel puțin 10 minute.

- expunere orală, clătiți atent gura cu apă. Nu administrați niciodată substanțe pe cale orală persoanelor inconștiente. Nu provocați vomă.

- Dacă se înghițire, consultați imediat medicul veterinar și prezentați ambalajul sau eticheta produsului. Contactați un medic veterinar specializat în chirurgie dacă produsul a fost ingerat de un animal de companie.

Capcanele trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: „a nu se muta sau deschide!”, „conține un produs rodenticid”, „RODIBROD SENSITIVE PASTA FLUO”; numărul de autorizație RO/2018/0197/MRA/UK-2015-0889” și „substanță activă: brodifacoum” și „în caz de incident, sunați la un centru de informare toxicologică: Spitalul Clinic de Urgență București, Strada Calea Floareș nr. 8, Sector 1, București, Tel: 0215992300, Fax: 0215992257, Apele de urgență 021 12”.

București, Strada Calea Floareș nr. 8, Sector 1, București, Tel: 0215992300, Fax: 0215992257, Apele de urgență 021 12”.

Pentru utilizare la interior: Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

Pentru utilizare la exterior, în jurul clădirilor: Atunci când amplasați capcanele în apropierea apelor de suprafață (de exemplu, râuri, iazuri, canale navigabile, diguri, canale de irigații) sau a sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa. Evitați prin orice mijloc pătrunderea în sistemul de canalizare și în afara de suprafață.

Instrucțiuni de eliminare în siguranță a produsului și ambalajului său: La sfârșitul perioadei de tratament, eliminați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu cerințele locale. Eliminarea resurselor de produse și a ambalajelor acestora se face în conformitate cu prevederile legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, de către operatori autorizați. Nu se realizează ambalajul și nu se eliberează în mediul produsul biocid.

Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului: A se păstra în ambalaj original, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A se păstra recipientul închis și ferit de lumina directă a soarelui. A se păstra în locuri unde nu au acces copii, pășari, animale de companie și animale de fermă. Perioadă de valabilitate: 2 ani de la data fabricației.

Alte informații: Din cauza modului lent de acțiune, rodenticidele anticoagulante își produc efectul după 4-10 zile de la consumul

momeli. Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile neprotejate, utilizați mănuși sau instrumente (de exemplu, clești) atunci când le îndepărtați. Acest produs conține un aditiv amar și un colorant.

NU RUPEȚI PUNGA DIN INTERIORUL AMBALAJULUI

Nr. lot și data de fabricație:



Distribuit de: Veterin Distribution SRL

Șoseaua Olteniței, nr. 247 077160

Popești-Leordeni, Ilfov Tel. 0371.190.455

www.veterindistributie.ro office@veterindistributie.ro



RODIBROD SENSITIVE PASTA FLUO - MOMEALĂ RODENTICIDĂ GATA PREGĂTITĂ, SUB FORMĂ DE PASTĂ (TP14)

Substanță activă:

Brodifacoum (Nr. CAS 56073-10-0, Nr. CE 259-980-5)

0,0029% g/g

UFI: DM00-G0A5-E00X-9QT7

Fraze de pericol

H373 Poate provoca leziuni ale organelor (sângelui) în caz de expunere prelungită sau repetată.

Fraze de prudență

P314 Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. P405 A se depozita sub cheie. P501 Aruncați conținutul/recipientul conform reglementărilor locale.

Nr. Autorizație: RO/2018/0197/MRA/UK-2015-0889

Deținător autorizație/Furnizor ZAPI S.p.A. Via Terza Strada, 12 35026 Conselve (PD) Italia - Tel. +39 049 9597737 www.zapispa.com – info@zapispa.com



ATENȚIE GHS08

Conținut: 10 Kg

075286V.TEER.RR